

Cryolaesie behandeling

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnspecialist voor een cryolaesie behandeling. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een cryolaesie behandeling?

Bij een cryolaesie behandeling wordt door middel van bevriezing gezorgd dat een bepaalde zenuw geen pijn meer geleidt. De koude wordt opgewekt door in een dun buisje (een soort dikke naald, die ook wel cryo-sonde genoemd wordt), koolzuurgas te laten stromen. Door de uitzetting van het koolzuurgas ontstaat aan het uiteinde van de cryosonde een zeer lage temperatuur, waarmee de zenuw bevroren kan worden.

Het doel van deze behandeling is het verminderen of opheffen van pijn.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

- U gebruikt bloedverdunders
- U bent (mogelijk) zwanger.
- U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
- U heeft een pacemaker of ICD.
- U heeft geen pijn meer.
- U bent de dag van de behandeling ziek of u heeft koorts

Vorbereiding

- U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
- U kunt uw medicatie gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
- Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
- Draag makkelijk zittende kleding.

Behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta.

U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte, vervolgens wordt u door een doktersassistente naar de betreffende ruimte gebracht.

Afhankelijk van de pijnlocatie vindt de behandeling liggend of zittend plaats.

De pijnspecialist bepaalt, al dan niet onder röntgendoorlichting of echogeleiding, de plaats welke zal worden behandeld. Na plaatselijke verdoving wordt er een klein steekgaatje gemaakt om de cryo-sonde te kunnen inbrengen. De pijnspecialist bepaalt zeer nauwkeurig de plaats van de punt van de cryo-sonde, waarna de behandeling begint. Meestal wordt twee keer twee minuten bevroren.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de aftercare-ruimte.

Zes tot acht weken na de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat beoordelen. U krijgt een afspraak voor controle bij Nocepta.

Behandelingsduur

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. De totale opname duurt wisselend tussen een half uur tot hooguit 2 uur.

Resultaat

Na een cryolaesie behandeling ervaren sommige patiënten vlak na de ingreep een toename van de pijn die ze al hadden. Hiervoor kunt een pijnstillert innemen zoals paracetamol. Deze napijn kan tot enkel dagen, maar soms ook enkele weken duren.

Pas na twee tot drie maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is mogelijk dat een gunstig effect al eerder optreedt. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Risico's of bijwerkingen

Ernstige complicaties komen zelden voor. Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig uitgevoerd, bestaat een geringe kans op complicaties.

- Mogelijk kan er lekkage van bloed ontstaan uit het steekgaatje van de behandeling.
- Er kan soms een allergie voor een gebruikt middel optreden, ook dit komt echter zelden voor.
- Soms kan er onder de huid een klein bloedinkje ontstaan dat een week meer pijn kan geven en zelf weer wegtrekt.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze dan vóór de behandeling of maak gebruik van het telefonisch spreekuur met de pijnconsulente van Nocepta. De pijnconsulente is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 11:00 uur en 12:00 uur op telefoonnummer 088-7087060.

Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:30 uur op telefoonnummer 088-7085080.