

## TAP-blokkade (pijnblokkade van de buikwand)

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een zenuwblokkade in de buik. De pijnspecialist verricht de blokkade. Hieronder leest u wat deze behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

### Wat is een TAP-blokkade?

Een TAP-blokkade wordt toegepast bij (chronische)pijn in de buikhuid. Deze kan veroorzaakt zijn na bijvoorbeeld een buikoperatie, door een litteken in de buikwand of na een keizersnede. Soms is de oorzaak voor de pijn niet gevonden. De pijn die u ervaart kan in de het midden of aan één zijde van de buik aanwezig zijn en wordt veelal veroorzaakt door verklevingen (littekenweefsel) in de buikwand, of door beknelling van één of meerdere kleine zenuwen in de buikwand.

### Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:


- U gebruikt bloedverdunners.
- U bent (mogelijk) zwanger.
- U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
- U heeft een pacemaker of ICD.
- U heeft geen pijn meer.
- U bent de dag van de behandeling ziek of u heeft koorts.

### Vorbereiding

- U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
- U kunt uw medicatie gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
- Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
- Draag makkelijk zittende kleding.

### Behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta. U kunt zich vooraf melden bij Nocepta in de wachtruimte, vervolgens wordt u door de doktersassistente naar de behandelkamer gebracht. Daar komt u op u rug op de behandeltafel te liggen. De pijnspecialist bepaalt onder echogeleiding de plaats welke zal worden behandeld (zie onderstaand plaatje, waarbij de lagen van de buikwand goed zichtbaar zijn).



Vervolgens word de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige of roze vloeistof. De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist de naald zal inbrengen. Staat de naald op de goede plaats dan wordt er medicatie ingespoten. Een combinatie van een verdovend en een ontstekingsremmend medicijn. Deze medicatie zal zich verspreiden in de laag van de buikwand om de pijn te verlichten.

## Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de aftercare ruimte.

De dag van de behandeling moet u het rustiger aandoen. De behandeling duurt ongeveer 20 min. U zult tevens 20-30 minuten op de nazorg verblijven. Ieder patiënt reageert verschillend op een behandeling. De nazorg kan hierdoor zowel korter als langer duren.

## Resultaat

- Na een TAP-blokkade kan er napijn optreden die 3-4 weken kan aanhouden. Die verdwijnt daarna vanzelf. U kunt in die periode gewoon pijnstilling nemen zoals paracetamol.
- Pas na twee tot drie maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is mogelijk dat een gunstig effect al eerder optreedt. Soms is een aanvullende behandeling nodig. U krijgt hiervoor na 6-8 weken een controle afspraak bij Nocepta.

## Complicaties of bijwerkingen

Ernstige complicaties komen zelden voor. Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig uitgevoerd, bestaat geringe kans op complicaties.

- Mogelijk kan er lekkage ontstaat uit het steekgaatje van de behandeling  
Bij infectie neemt u contact op met uw huisarts of Nocepta.
- Soms kan er allergie voor de gebruikte medicatie optreden, ook dit komt echter zelden voor.
- Tevens kunt u last krijgen van roodheid in uw gezicht of een wat gejaagd gevoel. Dit is een bijwerking van de gebruikte medicatie.
- Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.

## Vragen

**Als u vragen heeft kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van Nocepta.  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur ☎ 088-708 7060.**

**Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30-12:00 uur en van 13:00-15:30 uur op ☎ 088-708 5080.**

Anesthesiologen-pijnspecialist

**E.H. Gensen-Alblas**

**M. Hanje**

**F.A.J. Klaassen**

**N.P. Monteiro de Oliveira**

**M.A. Richardson**

BIG-nummer

49060674401

19051845201

19049907901

29913238101

09062515801

Anesthesiologen-pijnspecialist

**C. Robers**

**A.C.W. Setz**

**M.A.M. Simon**

**Dr. M. Uslu**

**R. Verheijen**

BIG-nummer

19023503301

69048621701

79023879401

29059938001

79024517701

Physician assistant

**M. Wijnstra**

**E. Benneker io**

**R. ter Riet io**

Verpleegkundig specialist  
**Mw. S. de Gooijer**

BIG-nummer

79050319581

09017103330

49017101130